

AMBROZIA-CAUZĂ A ALERGIILOR SEVERE

ANUNȚ!

STIMAȚI PROPRIETARI/DEȚINĂTORI SAU ADMINISTRATORI DE TERENURI, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA 62/2018 PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA, AVETI OBLIGAȚIA DE A DESFĂȘURA LUCRĂRI DE PREVENIRE, COMBATERE ȘI DISTRUGERE A ACESTEI PLANTE, PENTRU EVITAREA INSTALĂRII VEGETAȚIEI INVAZIVE ȘI ELIMINAREA EI ÎN CAZUL PREZENȚEI PE TERENURILE INTRAVILANE ȘI EXTRAVILANE.

În vederea distrugerii buruienii Ambrozia și a prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii și/sau administratorii de terenuri vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice.

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.3 alin.2 din Legea 62/2018 se sancționează cu amenda de la 1000 la 5000 lei, pentru persoane fizice și cu amenda de la 10000 la 20000 lei, pentru persoane juridice.



Ambrozia (Otrava zeilor) – este cunoscută ca fiind o buruiană periculoasă pentru sănătatea omului, provocând alergii și stări febrile puternice în perioada înfloririi.

Ambrozia se întâlnește de obicei pe marginea șoselelor și în culturi agricole, în care se practică tehnologia no-tillage – se intervine asupra solului doar prin semănat, buruiana fiind o mare iubitoare de soluri slab lucrate, nisipoase și ușor de încălzit.

O plantă poate face până la 60.000 de semințe ce își pot menține puterea germinativă peste 20 de ani. În prezent, ambrozia este planta cea mai alergenica din România, polenul acesteia fiind sursa principală a rinitelor alergice și astmului.

Descrierea buruienii

Buruiana face parte din familia Asteraceae și poate fi întâlnită în număr de 30 de subspecii pe întreg globul pământesc însă în România sunt întâlnite doar: *Artemisifolia*, *Trifida* și *Parviflora*. Buruiana poate ajunge la 150cm înălțime, are o rădăcina pivotant-conică, cu frunzele bipinatifidate dispuse altern pe lungimea plantei.

La densități mici aceasta ramifică, iar la densități mari planta poate avea aspect neramificat. Semințele sunt dispuse în spic acoperite de bractee de forma unui vârf de săgeată. Semințele care cad pe sol trebuie să treacă printr-o perioadă de dormanță pentru a putea germina.

Managementul combaterii acestei buruieni se realizează diferit în funcție de mediul în care se găsește.

Planta este cel mai des întâlnită pe terenurile necultivate, nisipoase sau slab lucrate, însă în zona de vest a țării aceasta s-a dezvoltat atât de tare încât este o buruienă frecvent întâlnită în cultura porumbului.

Există două tipuri de erbicide pe care le puteți utiliza cu succes pentru combaterea Ambrozei la noi în țară: erbicidele totale și cele selective.

1. Erbicidele totale precum Clinic Xpert se pot folosi pe terenurile necultivate dar și pe terenurile cultivate, înainte de răsărirea culturilor agricole.
2. Erbicidele selective precum Dicopur D, Dicopur Top 464 SL pot fi aplicate atât în culturi agricole precum grâu, orz sau porumb dar și pe pășuni sau zone în care nu se dorește distrugerea buruienilor monocotiledonate.

Deseori au fost raportate cazuri de ineficacitate a erbicidelor, datorită atacurilor de larve în interiorul lujerului plantei, fapt ce întrerupe circulația sevei și face translocarea erbicidului mult mai greoaie, tocmai din acest motiv se recomandă erbicidarea buruienii în primele stadii de dezvoltare.

Deși în România nu au fost semnalate cazuri de rezistență ale acestei buruieni la substanța activă glifosat, compania Nufarm vine în preîntâmpinarea acestui lucru și vă propune un erbicid inovativ și anume Kyleo, erbicid cu două substanțe active din clase diferite și cu moduri diferite de acțiune, ce împiedică dezvoltarea rezistenței Ambroziei la cele mai frecvente substanțe active folosite în combaterea ei.

Primar,

Verdeș Ștefan



Întocmit,

Grigore Roxana-Cristiana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Grigore Roxana-Cristiana", with a horizontal line drawn underneath it.